

CIRCUNCISIÓN

Es el procedimiento quirúrgico que consiste en eliminar el prepucio, la piel que cubre el glande. Se realiza principalmente debido a razones médicas, culturales, religiosas o cosméticas.

¿Por qué esta intervención?

Puede ser necesario eliminar el prepucio en varias circunstancias médicas como lo son:

- Fimosis / Parafimosis
- Enfermedad de la piel del glande y/o prepucio
- Balanitis a repetición

Beneficios del Procedimiento

- Mediante este procedimiento se pretende facilitar las relaciones sexuales, la higiene local y disminuir el riesgo de molestias e infecciones

¿Cómo se realiza?

- Esta intervención se realiza bajo sedación y/o anestesia local y no precisa hospitalización. La duración es de aproximadamente 1 hora. Se extirpa el prepucio y se colocan puntos absorbibles entre la piel del pene y la mucosa del glande, dejando descubierto el glande. Habitualmente el frenillo se secciona y sutura durante la intervención

¿Cómo debe Prepararse?

- En caso de optar por realizar la cirugía bajo sedación es necesario el ayuno por al menos 6h previo al procedimiento
- Si toma algún tipo de anticoagulante o antiagregante (aspirina, warfarina, Rivaroxaban, Clopidogrel entre otros) debe informar al médico para recomendaciones acerca de la suspensión previo al procedimiento
- Debe rasurarse la zona genital con bastante agua y jabón el día del procedimiento

¿Cuáles son los Riesgos o Posibles Complicaciones?

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención, así como otros específicos del procedimiento. Los posibles riesgos son:

- Sangrado (hematomas - reintervención)
- Infecciones de la herida quirúrgica (pérdida total o parcial del órgano)
- Cicatrización antiestética
- Lesión uretral con aparición de fístulas
- Aumento o disminución de la sensibilidad del glande de intensidad variable

Cuidados Post operatorios

- Los hilos se caen solos (reabsorbibles), estos por lo general se caen a las 2 semanas, pero pueden durar hasta 3 meses
- Agua y jabón en la herida quirúrgica
- Evitar relaciones sexuales por al menos 1 mes
- Se puede colocar hielo en sitio de herida quirúrgica al menos 4 veces al día por 1 semana
- Reposo por 1 mes, no hacer esfuerzos no realizar deportes de contacto
- Suspender vendaje al día siguiente de la cirugía con bastante agua y jabón
- Evitar erecciones por al menos 2 semanas

Si presenta aumento de tamaño del pene o cambio coloración en piel (se pone morado o negro) es importante que consulte o acuda al médico de forma inmediata para su valoración