

Cáncer Urológico

La Uro-Oncología o Urología Oncológica es una rama de la urología que se enfoca en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los cánceres que afectan el tracto urinario de ambos sexos y el sistema reproductor masculino

Esto incluye cánceres de: Próstata, Riñón, Testículos, Pene, Uretra

Hoy en día el cáncer de próstata es el tumor más frecuentemente diagnosticado en hombres en Costa Rica y el tercero en mortalidad en el país

Tratamiento Integral de Tumores Urológicos

Desde la consulta Uro-Oncológica podemos prevenir, diagnosticar y tratar los tumores urológicos

Dentro del tratamiento incluye una parte quirúrgica, que permite tratar con cirugía la mayor parte de los tumores y una parte médica que nos permite abordar el tratamiento en fases avanzadas de la enfermedad

Cáncer de Próstata

El tumor urológico más frecuente entre los hombres en Costa Rica. Se estima que aproximadamente 1 de cada 8 hombres va a padecer la enfermedad. Sus principales factores de riesgo son la edad, el antecedente heredo familiar y ser de raza negra. El Antígeno prostático Específico y el tacto rectal son fundamentales para su diagnóstico

Cáncer de Vejiga

Enfermedad oncológica que ocasiona lesiones vegetantes en el interior de la vejiga, suele causar sangrado en la orina o mucho ardor al orinar. Estas lesiones se pueden observar realizando una cistoscopia o en ocasiones mediante un ultrasonido. Factores de riesgo: Tabaquismo, edad y exposición a químicos como tintes y productos de caucho

Cáncer de Testículo

Tumor frecuente en pacientes jóvenes, entre los 20-45 años. Se diagnostica al examen físico documentándose una masa indurada e indolora localizada en el parénquima testicular. El ultrasonido y los marcadores tumorales también son importantes para el diagnóstico adecuado y seguimiento de la enfermedad. Los principales factores de riesgo son: antecedente personal o familiar de cáncer de testículo y la criptorquidea

Cáncer de Riñón

Dentro de los tumores más frecuentes en urología. Su diagnóstico cada vez es más frecuente por el uso del ultrasonido, como hallazgo incidental, ya que la mayoría de estos tumores no dan síntomas en sus etapas iniciales. En caso de dar síntomas lo más frecuente es la hematuria o el sangrado en la orina. Los principales factores de riesgo para este tumor son: Obesidad, HTA y tabaquismo

Cáncer de Pene

Menos frecuente, generalmente se asocia al VPH. Sus principales factores de riesgo son la edad, la mala higiene y la fimosis

